



СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ (КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК)



- ▶ Подтвержденная активность: вирулицидная, антибактериальная, фунгицидная;
- ▶ Пролонгированное действие в течение 3 ч
- ▶ Эффективность подтверждена в соответствии с Р 4.2.2643-2010 ИЛЦ ФБУН ГНЦ ПМБ и НИИДезинфектологии
- ▶ Не содержит спиртов, красителей, отдушек
- TY 20.20.14-042-99195003-2010



ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО И КАК ДЕЙСТВУЕТ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО P-508 ПЕНОСЕПТ ФОРТЕ? Средство обладает **вирулицидной активностью** в отношении рино-, норо-, рото-, аденовирусов, коронавирусов, вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, включая гепатиты A, B и C, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, вирусов гриппа, в т.ч. «свиного» H1N1 и «птичьего» H5N1, парагриппа, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), герпеса, кори, возбудителей ОРВИ, цитомегаловирусной инфекции и т.д.);

антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме туберкулеза) и грамотрицательных бактерий;

фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Не наносить на раны и слизистые оболочки. При попадании в глаза немедленно промыть проточной водой и при необходимости обратиться к врачу.

Хранить в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, при температуре от +5 °C до + 35 °C.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с Инструкцией

для получения облее подробной информации ознакомьтесь с ин по применению № 03/2020.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Гигиеническая обработка рук: 3 мл средства однократно нанести на кисти рук и втирать полного высыхания, обращая особое внимание на тщательность обработки околоногтевых лож и межпальцевых участков.

Время дезинфекционной выдержки: при бактериальных инфекциях – 1 минута, при вирусных инфекциях 2 минуты.

COCTAB

Средство сохраняет свои свойства после замораживания и нагревания.

Официальный дистрибьютор **KEMИЛАЙН®**WWW.CHEMILINE.RU

8-800-200-78-89

бесплатный звонок из любого региона РФ горячая линия: 8-800-100-7053 www.armakon.ru

+